

INLICHTINGENFORMULIER VULLINGSTECHNIKEN HYALURONZUURPREPARATEN

Deze informatie is bedoeld om de patiënt een beeld te geven van de vullingstechnieken met hyaluronzuur, zodat die met kennis van zaken toestemming kan geven. Dit toestemmingsformulier slaat alleen op producten die uitsluitend hyaluronzuurverbindingen bevatten die door het menselijk lichaam afgebroken kunnen worden, eventueel aangevuld met lidocaine (een lokaal verdovingsmiddel). De behandelende arts is uiteraard bereid om alle vragen over deze ingreep te beantwoorden tijdens een consultatie.

1. AARD EN VERLOOP VAN DE INGREEP

Plooivorming, rimpels en kleine defecten worden behandeld met een inspuiting van hyaluronzuurpreparaten (een gelachtige substantie). De inspuiting van hyaluronzuurpreparaten kan ook gebruikt worden in alle gebieden waar door veroudering een verlies aan volume is ontstaan (middelste derde van het gelaat, jukbogen, slapen, voorhoofd, wangen, rond mond, lippen, ...). Verschillende types van hyaluronzuur bestaan en worden op een specifieke diepte ingespoten: zeer oppervlakkig, dieper onder de huid en ook in diepere weefsellagen zoals in het vetweefsel en bovenop bot. Uw arts zal beslissen welk(e) product(en) voor uw specifiek probleem meest aangewezen zijn. In spuitbaar hyaluronzuur bestaat uit een verbinding van suikerachtige elementen en is een lichaamseigen product en wordt door het lichaam geleidelijk afgebroken. Na verloop van tijd is een nieuwe inspuiting nodig wil men het effect behouden.

2. GEGEVENS VAN DE PRODUCENT

Het gebruikte product van het gamma is afhankelijk van de anatomische lokalisatie van het gebruik. De gebruikte hoeveelheid wordt tijdens de behandeling in samenspraak met de patiënt bepaald. Er wordt doorgaans gekozen om met een zo beperkt mogelijke hoeveelheid product een zo effectief mogelijk resultaat te bereiken. De gegevens van het gebruikte product worden bijgehouden in het medisch dossier.

3. DOEL VAN DE INGREEP

Het doel van de ingreep is oppervlakkige plooiën of putjes of volumeverlies in de huid op te vullen. Daarbij kan echter niet steeds een volledig gave en vlakke huid verkregen worden. Het is niet steeds mogelijk de exacte hoeveelheid vulstof in te schatten en na enkele weken kan het nodig zijn een bijkomende hoeveelheid vulstof in te spuiten.

Zoals bij vrijwel elke medische ingreep bestaat er dus ook bij een vullingstechniek de mogelijkheid dat het beoogde doel niet volledig wordt bereikt. De arts komt derhalve met de patiënt overeen om volgens de regels van de kunst te werken, maar belooft geen welbepaald resultaat (= inspanningsverbintenis).

4. RISICO'S

Bloeding kan optreden met vorming van hematoom (blauwe vlek) dat echter meestal verdwijnt na enkele dagen of weken.

Een opstoot van koortsblaasjes kan voorkomen na een behandeling van lippen bij personen die gevoelig zijn aan herpes simplex virusinfecties. Wanneer de patiënt gevoelig is aan het optreden van koortsblaasjes zal een preventieve behandeling voorgeschreven worden.

Zwelling, kort na de inspuiting, maar ook op een later tijdstip (maanden na inspuiten) kan voorkomen en kan een uiting zijn van infectie van het implantaat of een allergische of immunologische reactie. Een infectie wordt medicamenteus behandeld. Een allergie voor hyaluronzuur bestaat, doch is extreem zeldzaam en allergische reacties kunnen ook behandeld worden met medicatie.

Ook is het te allen tijde mogelijk de ingespoten hyaluronzuurpreparaten op te lossen door het inspuiten van een enzyme dat hyaluronzuur oplost: hyaluronidase.

Een inspuiting van hyaluronzuur in een bloedvat is een ernstige complicatie, waarbij blijvende weefselbeschadiging met verlittekening of verlies van bepaalde functies (zicht) kan optreden. Dit komt extreem zelden voor. De meest recente technologie om de individuele arteriële anatomie van elke patiënt in kaart te brengen wordt aangeboden in de praktijk: <https://www.artery3d.com/how-it-works/>

5. GEVOLGEN

Gedurende enkele dagen kan er een lichte roodheid en zwelling optreden op de plaats van de inspuiting. In uitzonderlijke gevallen kan een ontstekingsreactie langer aanhouden moet aan een infectie of een allergische reactie gedacht worden.

De inspuitbare producten met hyaluronzuurpreparaten hebben een niet blijvend effect: na 4 tot 18 maanden (afhankelijk van het type implantaat, de anatomische lokalisatie en van de fabrikant van het product) wordt het product in de huid afgebroken en moet een nieuwe hoeveelheid worden ingespoten.

6. ALTERNATIEVEN

Bepaalde rimpels kunnen beter met een spierontspannende medicatie (type botulinum toxine) worden behandeld. Andere rimpels kunnen beter door laser, peeling of dermabrasie (afschuren met slijpkop) verbeterd worden. Wanneer de spanning in de huid te slap is kan het soms beter zijn de huid eerst aan te spannen door een lifting. Deze technieken kunnen, indien nodig, in combinatie worden gebruikt om het resultaat te verbeteren.

7. FOTO'S

Om het resultaat van de ingreep beter te kunnen beoordelen evenals voor educatieve en wetenschappelijke publicaties, kunnen eventueel foto's worden genomen. Op de foto's wordt de patiënt(e) onherkenbaar gemaakt. De patiënt(e) is hiervan op de hoogte en stemt hiermee in.

8. KOSTEN

Indien de ingreep wordt uitgevoerd omwille van esthetische redenen, wordt deze niet terugbetaald door het ziekenfonds én is ze wel onderhevig aan btw (21%). De kostprijs van de behandeling wordt mede beïnvloed door de aard van de aandoening (uitgebreidheid, hoeveelheid vullingsmateriaal ...).